

CT 用造影剤を使用する検査のための説明書

この用紙は造影剤検査の必要性、副作用についての説明書です。検査当日までに必ずお読みになって下さい。造影前より点滴を行いますが、水分制限の無い方は、造影剤の排泄を促す為に検査前は水分を普段より多めに摂取しておいて下さい。

※造影剤について

- ① 検査を行う上でより詳しい画像情報を得るために用いる検査用薬剤です。
- ② 通常静脈注射で行います。
- ③ CT 用のヨード造影剤は安全な薬ですが、他の薬と同様に副作用が出現することがあります。

※造影剤の副作用について次のようなものがあります。

- ① 軽い副作用：吐き気、嘔吐、かゆみ、発疹などで頻度は 3%程度
(基本的に治療は要しないものです)
- ② 重い副作用：呼吸困難、血圧低下、意識障害などで頻度は 0.04%程度
(通常は治療が必要で、後遺症が残る可能性があります)
- ③ 遅発性副作用：造影剤を使用した直後から症状が出る場合が大半ですが、1 時間～1 週間ほど経過してから症状(気分不良、じんましん、頭痛、脱力感、冷や汗など)が出る場合があります。そのような時は、速やかに当院へご連絡下さい。連絡先は下記に記載しています。
- ④ 他の薬剤と同様に症状、体質によっては、死亡例の報告があります。
(40 万件に 1 件で 0.00025%との報告があります)
- ⑤ 万が一副作用が現れた場合、最善の処置を施しますので気分不良や違和感など有りましたら遠慮せず検査担当者に申し出て下さい。
- ⑥ 検査内容に承諾し同意書を提出された後でも、当日の体調不良や検査をキャンセルされたい場合は、主治医、看護師または診療放射線技師にご相談下さい。

※検査後の注意

造影検査後は、水、お茶などの水分をいつもより多めに飲んで下さい。医師により水分制限をされている方は、医師の指示どおりにして下さい。

※その他の注意

- ① 糖尿病のお薬(メトグルコ・メタクト・メトホルミン・ジベトス・ジベトス S・ネルビス・メデット・グリコランなど)を飲んでおられる方は、検査日の前後 2 日間(検査日を含めて 5 日間)、糖尿病のお薬を服用しないで下さい。
- ② 造影剤は母乳中に移行しますので、造影剤注射後 4 8 時間の授乳は控えて下さい。

この造影検査説明書で解らないことや質問などありましたら担当医、看護師または診療放射線技師にご質問、ご相談下さい。

医療法人文佑会 原病院

TEL 092-581-1631

2023 年 8 月 1 日改訂